

# RUBOZINC

Gluconate de zinc

15 mg

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

**Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

**RUBOZINC 15 mg, gélule**

- La substance active est :

Gluconate de zinc

quantité correspondante en zinc

pour une gélule

..... 15 mg

- Autres composants : amidon de blé, silice colloïdale hydratée, stéarate de magnésium, lactose.

**Composition de l'enveloppe de la gélule :** gélatine, dioxyde de titane.

**Titulaire/Exploitant**

Laboratoire LABCAVAL

7 rue Roger Salengro

BP 305

92541 MONTROUGE Cedex

**Fabricant**

Laboratoire LABCAVAL

ZI du Mont Blanc

1, rue de l'Industrie

74100 ANNIEMASSE

## 1. QU'EST-CE QUE RUBOZINC 15 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Le médicament se présente sous forme de gélule : boîte de 30 et 60.

Il est indiqué dans :

- Acné inflammatoire de sévérité mineure et moyenne,
- Acrodermatite entéropathique.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE RUBOZINC 15 mg, gélule ?

- **Ne pas prendre RUBOZINC 15 mg, gélule, dans les cas suivants :**
- Si vous êtes allergique (hypersensible) au blé, en raison de la présence d'amidon de blé.
- Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez le avant de prendre ce médicament.

**En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.**

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI. MISES EN GARDE SPÉCIALES**

Pour une meilleure absorption du produit :

- le médicament sera pris à jeun, ou à distance des repas.

- Le médicament peut être administré en cas de maladie cœliaque. L'omdon de blé peut contenir du gluten, mais seulement à l'état de trace, et est donc considéré comme sans danger pour les sujets atteints d'une maladie cœliaque.
  - L'utilisation de RUBOZINC est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).
- NE JAMAIS LASSER A LA PORTEE DES ENFANTS.**

#### **INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS**

**AFIN D'EVITER D'EVENUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.**

#### **GROSSESSE ET ALLAITEMENT**

##### **Grossesse**

Ce médicament ne doit être utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous envisagez une grossesse ou si vous découvrez que vous êtes enceinte, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le traitement, tout en l'adaptant à votre état.

##### **Allaitement**

Le médicament peut être utilisé pendant l'allaitement. **LE MÉDICAMENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT D'ÉVITER D'UTILISER UN MÉDICAMENT.**

**L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.**

**EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NÉCESSAIRE POUR L'UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS**

Excipients à effet noiaire : omidon de blé, lactose.

#### **3. COMMENT PRENDRE RUBOZINC 15 mg, gélule ?**

Si vous avez l'impression que l'effet de RUBOZINC 15 mg, gélule est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

**VOIE ORALE**, à prendre à distance des repas.

##### **Âgé :**

- La dose journalière usuelle est de 2 gélules en une seule prise le matin à jeun ou à distance des repas avec un verre d'eau.
- Cette posologie de 2 gélules par jour est maintenue 3 mois, puis ramené ensuite à 1 seule gélule par jour.

**RUBOZINC 15 mg, gélule peut être utilisé lors de l'exposition solaire.**

##### **Acrodermieite entérodermique :**

La posologie journalière à respecter, au moins jusqu'à la guérison, est de 1 gélule.

- Au moment de la puberté, il peut être nécessaire d'augmenter la posologie à 2 gélules quotidiennes.
- **DANS TOUTS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.**

#### **4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?**

**COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRÂNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS :**

Au cours du traitement, il est possible que surviennent des douleurs de l'estomac et du ventre ; elles sont habituellement

modérées et transitoires.

**SIGNEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.**

#### **5. COMMENT CONSERVER RUBOZINC 15 mg, gélule ?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Date de révision de la notice : août 2009.

11090910910