

Eludril COLLUTOIRE

DIGLUCONATE DE CHLORHEXIDINE
CHLORHYDRATE DE TÉTRACAÏNE

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 5 jours, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que ELUDRIL, collutoire et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ELUDRIL, collutoire ?
3. Comment prendre ELUDRIL, collutoire ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ELUDRIL, collutoire ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ELUDRIL, collutoire ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

ANTISEPTIQUE LOCAL/ANESTHÉSIQUE LOCAL

Ce médicament est une solution anesthésique locale et antiseptique.

Ce médicament est préconisé en cas de mal de gorge peu intense et sans fièvre, d'aphtes et de petites plaies de la bouche.

Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER ELUDRIL, Collutoire ?

Ne prenez jamais ELUDRIL :

- chez l'enfant de moins de 6 ans. Entre 6 et 12 ans, il ne doit être utilisé que sur prescription médicale,
- si vous êtes allergique à la chlorhexidine, à la tétracéïne ou à l'un des autres composants contenus dans ELUDRIL

Précautions d'emploi :

- Respecter la posologie indiquée ; pris en quantité importante, ce médicament passant la circulation sanguine, est susceptible de retentir sur le cœur et sur le système nerveux (avec possibilité de convulsions).
- Éviter l'usage avant les repas, l'anesthésie provoquée par ce médicament est susceptible de favoriser les fausses routes lors de la déglutition des aliments. Il est donc impératif :
 - de n'utiliser ce médicament qu'avec précaution chez l'enfant de moins de 12 ans ;
 - de ne pas utiliser ce médicament avant les repas ou avant la prise de boisson.

Faites attention avec ELUDRIL :

En cas de survenue :

- de fièvre,
- d'expectoration (crachat) purulente,
- d'une gêne à la déglutition des aliments,
- de lésions étendues.

En cas d'aggravation ou d'absence d'amélioration au bout de 5 jours : CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN. EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Mises en garde spéciales :

L'usage prolongé (plus de 5 jours) de ce médicament n'est pas souhaitable car il est susceptible de modifier l'équilibre microbien naturel de la gorge. Cette spécialité ne doit pas être mise en contact avec les yeux, ni introduite dans le nez ni dans les oreilles.

Utilisation d'autres médicaments :

Ne pas utiliser en même temps plusieurs médicaments contenant un antiseptique. Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement :

Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement. D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs :

L'attention des sportifs sera attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif (la tétracéïne) pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

3. COMMENT UTILISER ELUDRIL, collutoire ?

Posologie :

Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans.

A distance des repas : Adultes et enfants de plus de 12 ans : 3 à 5 pulvérisations par jour.

Enfants de 6 à 12 ans : se conformer à la prescription médicale.

Mode et voie d'administration :

Voie buccale. Pulvériser en maintenant le flacon verticalement.

Durée du traitement :

L'usage prolongé (plus de 5 jours) de ce médicament n'est pas souhaitable car il est susceptible de modifier l'équilibre microbien naturel de la gorge.

Si vous avez pris plus de ELUDRIL que vous n'auriez dû :

Les effets mentionnés ci-dessous ne sont pas attendus dans les conditions normales d'utilisation :

En cas de surdosage massif (concentrations très élevées), les troubles suivants peuvent apparaître :

- avec la chlorhexidine : des troubles gastro-intestinaux (nausées, vomissements, diarrhées), une irritation locale (gorge, œsophage).
- avec la tétracéïne : comme pour tout anesthésique local, la tétracéïne peut provoquer des troubles neurologiques (nervosité, troubles de la vue, convulsions...), des troubles cardiovasculaires (hypotension, ralentissement du rythme cardiaque, troubles du rythme cardiaque).

Le traitement est symptomatique en milieu spécialisé.

Si vous avez oublié de prendre ELUDRIL :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments ELUDRIL est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Les effets suivants peuvent survenir :

- possibilité de survenue de rougeur, de gonflements du visage et de la gorge : dans ce cas, arrêter le traitement,
- possibilité d'engourdissement passager de la langue,
- une coloration brune peut apparaître sur la langue, elle est sans danger et disparaît à l'arrêt du traitement. Une coloration des dents peut également survenir, elle peut être facilement prévenue par un brossage quotidien,
- en cas de fausse route (toux au cours d'un repas avec impression « d'avaler de travers ») : il est conseillé d'interrompre le traitement et de demander l'avis d'un médecin.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette

notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance – Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER ELUDRIL, collutoire ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser ELUDRIL après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient ELUDRIL ?

Les substances actives sont :

Digluconate de chlorhexidine, Chlorhydrate de tétracéïne

Les autres composants sont :

Alcool, macrogol 300, Saccharine sodique, composition aromatique IFF 26 L 226 (Alcoolat de citron, vanilline, huiles essentielles de menthe poivrée et d'eucalyptus, menthol naturel, citral), acide phosphorique concentré, eau purifiée. Gaz propulseur : azote

Qu'est-ce que ELUDRIL ?

Collutoire. Flacon pressurisé de 55 ml

Titulaire/Exploitant : PIERRE FABRE MÉDICAMENT

45, place Abel-Gance – 92100 Boulogne

Fabricant : PIERRE FABRE MÉDICAMENT PRODUCTION

Site Progipham

Rue du Lycée + 45500 Gien

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 13 février 2015.

Information médicale : Tél. 0800 950 564.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l'ANSM (France).



CONSIGNE POUR VOTRE LOCALITÉ : WWW.CONSIGNESETIEN.FR - INABLE UNCLEMENT POUR LA FRANCE

**Pierre Fabre
ORAL CARE**