

## Cantalène - comprimés à sucer

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

- Ce médicament est une spécialité d'AUTOMEDICATION destinée à être utilisée sans consultation ni prescription d'un médecin.
- La persistance des symptômes, l'aggravation ou l'apparition de nouveaux troubles après 5 jours de traitement imposent de prendre un avis médical.
- Lisez attentivement la notice, et pour toute précision, comme en cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien

### **Pans cette notice :**

- 1 – **Qu'est-ce que CANTALENE, comprimé à sucer et dans quels cas est-il utilisé ?**
- 2 – **Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CANTALENE, comprimé à sucer ?**
- 3 – **Comment prendre CANTALENE, comprimé à sucer ?**
- 4 – **Quels sont les effets indésirables éventuels ?**
- 5 – **Comment conserver CANTALENE, comprimé à sucer ?**
- 6 – **Informations supplémentaires**

#### **1. QU'EST-CE QUE CANTALENE, comprimé à sucer ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

ANTISEPTIQUE LOCAL (R02A : préparation pour la gorge)

Ce médicament est indiqué en cas de mal de gorge peu intense et sans fièvre, d'aphtes et de petites plaies de la bouche chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans.

N.B. : devant les signes cliniques généraux d'infection bactérienne, une antibiothérapie par voie générale doit être envisagée.

#### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CANTALENE, comprimé à sucer ?**

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament. **Ne prenez jamais**

##### **CANTALENE, comprimé à sucer :**

- Chez l'enfant de moins de 6 ans,
- Si vous êtes allergique aux anesthésiques locaux, à la chlorhexidine ou aux autres composants contenus dans ce médicament,
- En cas de phénylcétonurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance), en raison de la présence d'aspartam.

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN. Faites attention avec CANTALENE, comprimé à sucer :**

- L'anesthésie provoquée par ce médicament au niveau de la gorge peut favoriser les fausses routes (toux au cours d'un repas avec impression «d avaler de travers») lors de la déglutition des aliments.

Il est donc impératif :

- de n'utiliser ce médicament qu'avec précaution chez l'enfant de moins de 12 ans,
- de ne pas utiliser ce médicament avant les repas ou avant la prise de boisson.
- L'usage prolongé (plus de 5 jours) de ce médicament n'est pas souhaitable, car il peut modifier l'équilibre microbien naturel de la bouche, de la gorge.
- Mal de gorge : en cas de survenue de fièvre, d'expectorations (crachats) purulentes, d'une gêne à la déglutition des aliments, comme en cas d'aggravation ou d'absence d'amélioration au bout de 5 jours : CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.
- Aphtes, petites plaies de la bouche : en cas de lésions étendues, d'extensions des lésions, d'apparition de fièvre : CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.
- **NE PAS LAISSER CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS**
- L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares)
- Ce médicament contient 0,93 g de saccharose par comprimé, dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou en cas de diabète.

**EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN. Prise ou utilisation d'autres médicaments**

Ce médicament contient un anesthésique local (chlorhydrate de tétracaine) et de la chlorhexidine (antiseptique). D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir mode d'emploi et posologie).

N'utilisez pas en même temps plusieurs médicaments contenant un antiseptique.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre pharmacien.

##### **Aliments et boissons**

Les pastilles ne doivent pas être prises avant les repas ou avant la prise de boisson.

##### **Grossesse et allaitement**

###### **Grossesse**

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

###### **Allaitement**

L'utilisation de ce médicament est à éviter en cas d'allaitement.

Ne prenez pas de médicament pendant la grossesse ou l'allaitement sans avoir demandé l'avis de votre médecin <u>ou de votre pharmacien.</u>
---

##### **Sportifs**

L'attention des sportifs sera attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif (la tétracaine) pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles anti-dopage.

##### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Aucun effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n'a été observé. **Informations importantes concernant certains composants de CANTALENE, comprimé à sucer**

Liste des excipients à effet notable : Aspartam, saccharose.

#### **7 COMMENT PRENDRE CANTALENE, comprimé à sucer ? Posologie**

Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans. Adulte et enfant de plus de 15 ans :

- 1 comprimé à sucer 6 fois par 24 heures
- les prises doivent être espacées d'au moins 2 heures. Enfant de 6 ans à 15 ans :
- 1 comprimé à sucer 3 fois par 24 heures
- les prises doivent être espacées d'au moins 4 heures. **Voie d'administration**

Voie buccale.

Sucer lentement les comprimés sans les croquer.

#### **Durée du traitement**

La durée d'utilisation est limitée à 5 jours.

En cas de persistance des symptômes au-delà de 5 jours, consultez votre médecin. **SI vous avez pris plus de CANTALENE, comprimé à sucer que vous n'auriez dû :**

Pris en quantité importante ou de façon répétée, ce médicament peut passer dans la circulation sanguine et risque d'avoir des effets sur le cœur et sur le système nerveux entraînant de possibles convulsions.

#### **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, CANTALENE, comprimé à sucer est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :

##### **Les effets suivants peuvent survenir :**

- éruptions cutanées (réactions allergiques sur la peau) : dans ce cas, arrêtez le traitement ;
- possibilité d'engourdissement passager de la langue ;
- en cas de fausse route (toux au cours d'un repas avec impression d'«avalé de travers»), il est conseillé d'interrompre le traitement et de demander l'avis d'un médecin.
- une coloration brune de la langue : elle est sans danger et disparaît à l'arrêt du traitement.
- une coloration des dents peut également survenir ; elle peut être facilement prévenue par un brossage quotidien.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

##### **• COMMENT CONSERVER CANTALENE, comprimé à sucer ?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser CANTALENE, comprimé à sucer après la date de péremption mentionnée sur la boîte et/ou le blister après EXP. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

#### **6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**

##### **Que contient CANTALENE, comprimé à sucer 1 Les substances actives sont :**

Chlorhydrate de lysozyme.....	20,00 mg
quantité correspondante en unités Hartsell de lysozyme .....	2.10 <sup>6</sup> unités
Acétate de chlorhexidine .....	2,00 mg
Chlorhydrate de tétracéine.....	0,20 mg

Pour un comprimé de 1 g.

Un comprimé contient 0,93 g de saccharose.

##### **Les autres composants sont :**

Vanilline, arôme fraise\*, aspartam, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium, alvéosucres à 2,5% de maltodextrine\*\*.

\* Composition de l'arôme fraise : esters éthyliques des acides acétique, butyrique, valérianique, maltol, éthylmaltol, gamma-undécalactone, vanilline, gomme arabique, maltodextrine.

\*\* Composition de l'alvéosucres à 2,5 % de maltodextrine : saccharose, maltodextrine.

##### **Qu'est-ce que CANTALENE, comprimé à sucer et contenu de l'emballage extérieur ?**

Comprimé à sucer. Boîte de 24 comprimés.

##### **Titulaire / Exploitant**

##### **Fabricant**

**COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE DELPHARM BRETIGNY**

Place Lucien Auvert – 77020 MELUN CEDEX

Usine du Petit Paris – 91220 BRETIGNY SUR ORGE

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 14 janvier 2010.**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).