

## **GROSSESSE - ALLAITEMENT**

Pendant l'allaitement, la prise de ce médicament est déconseillée en raison du passage des constituants dans le lait maternel.

## **POSOLOGIE**

Réservé à l'adulte.

1 à 2 suppositoires par jour.

**CE MÉDICAMENT VOUS A ÉTÉ PERSONNELLEMENT DÉLIVRÉ DANS UNE SITUATION PRÉCISE. IL PEUT NE PAS ÊTRE ADAPTÉ A UN AUTRE CAS ET NE PEUT PAS ÊTRE CONSEILLÉ A UNE AUTRE PERSONNE.**

**MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :** voie rectale.

Le choix de la voie rectale est déterminé par la commodité d'administration du médicament.

## **DURÉE DU TRAITEMENT**

L'utilisation de la voie rectale doit être la plus courte possible (quelques jours) en raison des risques de toxicité locale.

## **CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE**

La forme suppositoire rend cette éventualité improbable.

## **EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS (EFFETS INDÉSIRABLES)**

Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants.

Des effets locaux (irritation de l'anus ou du rectum) liés à la voie d'administration, peuvent être observés. Ils sont d'autant plus fréquents et intenses que la durée d'utilisation est prolongée, le rythme d'administration et la posologie élevés.

En cas de non-respect de la dose recommandée, risque d'agitation et de confusion chez le sujet âgé, en raison de la présence de dérivés terpéniques.

**NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

**SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.**

## **CONSERVATION**

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

**DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE :** 13 février 2008

**MALVOYANTS : UNE NOTICE EN BRAILLE VOUS SERA ADRESSÉE SUR SIMPLE DEMANDE AU : 08 00 39 39 51**