

et du galactose ou un déficit en sucrase/
isomaltase (maladies héréditaires rares).

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A
DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU
DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment
un autre médicament, y compris un
médicament obtenu sans ordonnance,
parlez-en à votre médecin ou à votre
pharmacien.

Grossesse et Allaitement

Il est préférable de ne pas utiliser ce
médicament pendant la grossesse.
Si vous découvrez que vous êtes enceinte
pendant le traitement, consultez votre
médecin car lui seul peut juger de la
nécessité de le poursuivre.
L'utilisation de ce médicament est à éviter
pendant l'allaitement.
D'une façon générale, il convient, au
cours de la grossesse et de l'allaitement de
toujours demander avis à votre médecin ou
à votre pharmacien avant de prendre tout
médicament.

Excipient à effet notoire : saccharose.

3. COMMENT PRENDRE DIFRAREL® E, comprimé enrobé ?

Posologie :

3 à 6 comprimés par jour.

Mode et voie d'administration :

Voie orale.

Les comprimés sont à avaler, sans les
croquer, avec un verre d'eau.

saccharose, amidon de maïs, talc, dioxyde
de titane (E 171), Opaglos 6000.

QU'EST-CE QUE DIFRAREL® E, comprimé enrobé et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme
de comprimé enrobé, boîte de 24 ou
60 comprimés enrobés.

Titulaire / Exploitant :

Laboratoires LEURQUIN MEDIOLANUM

86-88, rue Ampère
Z.I. des Chanoux
93330 NEUILLY SUR MARNE

Fabricant :

CENEXI

68-84, rue Ampère
Z.I. des Chanoux
93330 NEUILLY SUR MARNE

La dernière date à laquelle cette notice
a été approuvée est : octobre 2010.

Des informations détaillées sur ce
médicament sont disponibles sur le site
Internet de l'Afssaps (France).

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égoût ou avec
les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut
faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger
l'environnement