

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS NOCIVES ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, SIGNALEZ A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT TRAITEMENT EN COURS.

Ce médicament contient du LOPERAMIDE. D'autres médicaments en contiennent.  
Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées  
(voir « Mode d'emploi » et « Posologie »).

## SI VOUS ÊTES ENCEINTE OU SI VOUS ALLAITEZ :

Ne prenez pas ce médicament sans avoir demandé l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.  
Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre ce traitement.

L'allaitement demeure possible en cas de traitement bref par ce médicament.

## CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES :

Attention ! Ce médicament provoque parfois une somnolence discrète et transitoire ou des vertiges risquant d'être dangereux lors de la conduite de véhicules et de l'utilisation de certaines machines.

## COMMENT DEVEZ-VOUS UTILISER CE MÉDICAMENT :

N'utilisez pas ce médicament chez l'enfant (moins de 15 ans)

## POSOLOGIE :

Réservé à l'adulte (à partir de 15 ans)

- Commencez par 2 gélules en une seule prise (soit 4 mg de loperamide)
- Si la diarrhée continue : après chaque selle non moulée, prenez 1 gélule supplémentaire, mais :
  - Ne jamais dépasser 6 gélules par jour,
  - Ne jamais dépasser 2 jours de traitement

## MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION : Voie orale.

Avaler les gélules à l'aide d'un verre d'eau.

## ESPACEZ LES PRISES

Prenez 1 gélule après chaque selle non moulée, mais :

- Ne jamais dépasser 6 gélules par jour,
- Ne jamais dépasser 2 jours de traitement

## DURÉE DU TRAITEMENT :

La durée d'utilisation est limitée à 2 jours.

## CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE :

En cas de surdosage accidentel, ARRÊTEZ LE TRAITEMENT ET CONSULTEZ RAPIDEMENT VOTRE MÉDECIN.

## ! QUELS SONT LES EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS DU MÉDICAMENT

CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÉNANTS :

- Constipation et/ou distension du ventre
- Douleurs du ventre, ballonnements, nausées, vomissements, sécheresse de la bouche,
- Réactions allergiques (éruption cutanée, urticaire et exceptionnellement choc allergique grave),
- Fatigue, somnolence, vertiges.

NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET À SIGNALER A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

## ! CONSERVATION :

NE LE PRENEZ PAS APRÈS LA DATE LIMITE D'UTILISATION INSCRITE SUR L'EMBALLAGE.

CONSERVEZ CE MÉDICAMENT à une température ne dépassant pas 30°C.

TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

## → DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE : Décembre 2000.