

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Carbosylane gélule

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Charbon activé..... 140 mg

Siméticone..... 45 mg

Excipients: Oléate de sorbitan et polysorbate 80.

Pour une gélule bleue ou rouge.

Enveloppe de la gélule bleue: Gélatine, indigotine (E132), dioxyde de titane (E171).

Enveloppe de la gélule rouge: Gélatine, érythrosine (E127), dioxyde de titane (E171), indigotine (E132).

Enrobage gastro-résistant de la gélule rouge: Acétate phtalate de cellulose, phtalate de diéthyle.

FORME PHARMACEUTIQUE

Gélule ; boîtes de : 48 (soit 24 doses), 96 (soit 48 doses).

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTIFLATULENT / ADSORBANT INTESTINAL

NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT

Laboratoires GRIMBERG - 19, rue Poliveau - 75005 PARIS - FRANCE

NOM ET ADRESSE DU FABRICANT

Laboratoires GRIMBERG

Z.A. des Boutries - 5 Rue Vermont - 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE - FRANCE

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT?

(INDICATIONS THERAPEUTIQUES)

Ce médicament est indiqué chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans dans le traitement symptomatique des états