

GRANIONS® DE CUIVRE - Cuivre
0,3 mg/2 ml, solution buvable en ampoule.

• **FORME PHARMACEUTIQUE**

Solution buvable, ampoule de 2 ml, boîte de 30.

• **CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE ***

OLIGOTHERAPE (V : divers).

• **DANS QUEL CAS UTILISER CE MEDICAMENT**

Ce médicament est utilisé comme modificateur du terrain en particulier au cours d'états infectieux et viraux, d'états grippaux, au cours d'affections rhumatismales inflammatoires et au cours de l'arthrose.

• **ATTENTION !**

a) **DANS QUEL CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT.**

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ en cas d'antécédent d'allergie à l'un des constituants de la solution.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

b) **MISES EN GARDE SPECIALES.** Le traitement par cet élément minéral trace

ne dispense pas d'un traitement spécifique éventuel.

c) **PRECAUTIONS D'EMPLOI.** EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

d) **INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS.** AFIN D'EVITER D'EVENUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

e) **GROSSESSE - ALLAITEMENT.** Par mesure de précaution, l'utilisation de ce médicament est à éviter pendant la grossesse et l'allaitement. D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

f) **LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NECESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS.**

Hydrosulfite de sodium, sulfite de sodium.

• **COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT**

a) **POSOLOGIE**

RÉSERVÉ À L'ADULTE : 2 à 3 ampoules par jour.

Traitement de l'arthrose : 1 ampoule 3 fois par jour.

b) **MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION.**

Voie orale. Il est conseillé d'absorber le contenu des ampoules dilué dans un verre d'eau, de préférence en dehors des repas.



• **EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÉNANTS**

En raison de la présence de sulfite, risque de réactions allergiques, y compris réaction allergique généralisée avec gêne respiratoire.
NE PAS HESITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET À SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÉNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

• **CONSERVATION**

- NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

- Un léger dépôt dans la solution n'est pas anormal. Il est dû à la nature colloïdale de la solution. Dans ce cas, agiter l'ampoule avant utilisation.

• **DATE DE REVISION DE LA NOTICE :** 26 janvier 2008.