

SEDACOLLYRE CETYLPYRIDINIUM 0,25 POUR MILLE, collyre en récipient unidose

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Elle contient des informations importantes pour votre traitement

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice

1. Qu'est-ce que Sédacollyre Cétypyridinium 0,25 ‰, collyre en récipient unidose et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Sédacollyre Cétypyridinium 0,25 ‰, collyre en récipient unidose ?
3. Comment utiliser Sédacollyre Cétypyridinium 0,25 ‰, collyre en récipient unidose ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Sédacollyre Cétypyridinium 0,25 ‰, collyre en récipient unidose ?
6. Informations supplémentaires.

1. Qu'est-ce que Sédacollyre Cétypyridinium 0,25 ‰, collyre en récipient unidose et dans quels cas est-il utilisé ?

Ce médicament est un antiseptique local à usage ophtalmologique. Il est indiqué dans certaines affections superficielles de l'œil et de ses annexes.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Sédacollyre Cétypyridinium 0,25 ‰, collyre en récipient unidose ?

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- Antécédents d'allergie à l'un des constituants du collyre ou à un autre ammonium quaternaire. EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
- ### Mises en gardes spéciales :
- Ne pas injecter, ne pas avaler.
 - En cas de réaction allergique, arrêtez le traitement et consultez votre médecin.
 - En cas de traitement concomitant par un autre collyre, attendre au minimum 15 minutes entre chaque instillation.
 - Ne pas utiliser simultanément plusieurs collyres antiseptiques.
 - Respecter la posologie préconisée et ne pas prolonger le traitement au delà de 7 jours.
 - En cas d'absence d'amélioration au delà de 7 jours, comme en cas d'aggravation des symptômes, consultez votre médecin.

Précautions d'emploi :

Utiliser ce médicament AVEC PRECAUTION :


- l'unidose doit être jetée immédiatement après usage et ne doit pas être conservée en vue d'une réutilisation lors des administrations suivantes
 - ne pas toucher l'œil avec l'extrémité de l'unidose
 - l'utilisation de ce collyre doit être évitée chez les porteurs de lentilles de contact
- EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments :

AFIN D'EVITER D'EVENUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS, EN PARTICULIER LES AUTRES COLLYRES UTILISES et notamment ceux contenant de la fluorescéine, du nitrate de pilocarpine, ou d'autres antiseptiques (sels d'argent, acide borique, salicylates).

Grossesse et allaitement

D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER CE COLLYRE.



* 6 5 N O T 6 5 3 7 / A *

3. Comment utiliser Sédacollyre Cétilypridinium 0,25 %, collyre en récipient unidose ?

Posologie :

1 goutte, 3 à 4 fois par jour.

Mode et voie d'administration :

Voie locale en instillation oculaire.

Instillez 1 goutte de collyre dans le cul de sac conjonctival inférieur de l'œil à traiter, en tirant la paupière inférieure légèrement vers le bas, et en regardant vers le haut.

Pour utiliser l'unidose, vous devez procéder de la façon suivante :

- se laver soigneusement les mains ;
- déchirer au niveau de l'encoche, la pochette protectrice qui enveloppe 5 unidoses ;
- détacher une unidose en maintenant fermement la plaquette de l'autre main ;
- l'ouverture de l'unidose s'obtient en la prenant par chaque extrémité et en effectuant une rotation ;
- renverser l'unidose pour faire descendre le collyre vers l'extrémité ouverte ;
- regarder vers le haut et tirer la paupière inférieure vers le bas ;
- instiller le collyre dans l'œil en pressant légèrement l'unidose ;
- ne touchez pas l'œil avec l'extrémité de l'unidose ;
- jeter l'unidose ;
- afin d'instiller une solution toujours stérile, utilisez une nouvelle unidose lors de chaque application.

Fréquence et moment auxquels le médicament doit être administré

Le collyre doit être instillé 3 à 4 fois par jour.

Durée du traitement

En moyenne 7 jours. Ne prolongez pas le traitement au-delà de 7 jours.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tout produit actif, ce collyre peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants: possibilité d'irritation passagère, risque de réaction allergique.

En cas d'apparition de symptômes anormaux (rougeur et/ou douleur de l'œil) arrêtez le traitement et consultez votre médecin. **SIGNEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.**

5. Comment conserver Sédacollyre Cétilypridinium 0,25 %, collyre en récipient unidose ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Date de péremption

Ne pas utiliser ce médicament après la date de péremption mentionnée sur la boîte ou le récipient unidose. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Conditions de conservation

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C. Ce médicament doit être jeté après usage et ne pas être conservé après ouverture.

6. Informations supplémentaires

La substance active est : Cétilypridinium (chlorure) 0,10 mg

Pour un récipient unidose de 0,4 ml

Les autres composants sont : Sodium hydrogénéphosphate dodécahydraté, potassium hydrogénéphosphate, eau purifiée.

Collyre. Boîte de 10 récipients unidoses de 0,4 ml.

Titulaire - Exploitant

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE
PLACE LUCIEN AUVERT - 77020 MELUN CEDEX

Fabricant

LABORATOIRES UNITHER
10, RUE ANDRÉ DUROUCHEZ - 80084 AMIENS CEDEX 2

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 15 octobre 2010.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Assaps (France) : www.assaps.fr